

fruits, se rapportent parfaitement à l'*Æ. peucedanifolia* décrit par M. Foucaud, ainsi que nous le dit cet auteur. Il en est de même des *Æ. media* de Belgique que M. Gadeceau a pu examiner et étudier avec M. Lloyd dans l'herbier du Maître, tandis que les *Æ. media* Gris. publiés d'Orient, par M. de Heldreich et examinés dans le même herbier, appartiennent au contraire, comme le dit M. Foucaud, à l'*Æ. silaifolia* de ce dernier auteur.

Nous n'avons pas, pour l'instant, à nous préoccuper outre mesure, nous dit M. Gadeceau, de cette question de synonymie litigieuse, mais bien de rechercher, dans notre région, les deux formes d'*Ænanthe* décrites par M. Foucaud; et M. Gadeceau prie les botanistes herborisants qui rencontreraient en beaux fruits *très* mûrs, la seconde forme, à fruits rétrécis aux deux bouts, de vouloir bien la lui communiquer, avec la localité précise.

*Muséum :*

M. L. BUREAU présente une femelle d'*Autour pondeuse* encore revêtue de son *premier plumage*. Ce sujet tué par M. Etienne Bureau dans la forêt d'Ancenis, le 10 avril 1893, couvait une ponte de trois œufs.

Il annonce ensuite la capture d'une Tortue marine, *Sphargis coriacea* du poids de 360 kilog. pêchée dans la baie d'Audierne (Finistère), le 13 avril 1893 et acquise aussitôt par le Museum de Nantes. Les apparitions de cette espèce sur les côtes de France sont d'une excessive rareté. Une note à ce sujet paraîtra au Bulletin.

M. L. Bureau présente ensuite quelques *Agria Thau* ou *Bombyx Thau*, lépidoptère, capturé dans les futaies de la Meilleraye, commune de Riailé, le 8 avril 1893 et où il le connaît depuis le 10 avril 1863. Cette espèce qui ne figure pas dans le catalogue des Lépidoptères de la Loire-Inférieure, se trouve aussi, quoique moins abondamment, dans les forêts d'Ancenis et de Vioreau. M. Ducoudray-Bourgault la captura, il y a longtemps déjà, dans la forêt de Rennes. Elle doit se trouver dans la plupart des grandes forêts de l'Ouest, particulièrement dans les grandes futaies.

---