

Sur quelques Insectes Névroptères
de Saint-Nazaire (Loire-Inférieure) et environs
(2^e série)

par le R. P. LONGINOS NAVÁS (S. J.).

Un jeune naturaliste, M. P. REVELIÈRE, de Saint-Nazaire, m'ayant communiqué le produit de ses chasses névroptériques, j'ai eu le plaisir d'en rendre compte dans la *Feuille des Jeunes Naturalistes*, p. 69-70. Ses chasses de cette année ne sont pas moins intéressantes que les précédentes et j'estime que leur publication sera bien utile, d'une part, pour contribuer à la connaissance de la faune de France (malheureusement très imparfaitement connue pour les Névroptères) et d'autre part pour engager les jeunes naturalistes français à de semblables recherches, dans l'espoir de trouver toujours quelque chose de nouveau pour leur région, pour la France entière et peut-être pour la science.

Dans l'énumération qui va suivre, j'omettrai les espèces de la même localité qui ont été citées dans mon article publié dans la *Feuille*.

Je ferai l'énumération simplement par ordre de familles, sans indiquer d'autres divisions.

Libellulides. — *Leptetrum* (Libellula auct.) *quadrinaculatum* L. Blain, juin. — *Leptetrum fulvum* Müll. Blain, juin. — *Cordulia aenea* L. Blain, 10 mai.

Eschnides. — *Aeschna isosceles* Müll. (*rufescens* V. d. L.), Saint-Nazaire, mai. — *Gomphus pulchellus* Sel. Blain, 19 mai.

Agrionides. — *Agrion* ⁽¹⁾ (*Calopteryx* auct.) *splendens* Harr. Blain, juin. — *Caenagrion* (*Agrion* auct.) *puella* L. Blain.

Éphémérides. — *Ephemera vulgata* L. Blain. — *Cloeon simile* Eat. Blain, mai.

Myrméléonides. — *Acanthaclisis baetica* Ramb. Mindin. J'ignore par quelle hallucination ou erreur de plume dans mon article précédent j'ai écrit *A. occitanica*; mes échantillons portaient bien le nom de *baetica*. C'est donc la localité citée qui étend l'aire géographique de l'*A. baetica* (pas de l'*occitanica*). Je l'avais aussi reçue d'Évreux.

Chrysopides. — *Chrysocerca flava* Scop. Saint-Nazaire, juin. Un couple. On ne l'avait pas citée de France, du moins avec ce nom.

Hémérobides. — *Sisyrha fuscata* F. Blain, mai. — *Hemerobius*

(1) J'ai adopté ce nom générique proposé par M. KIRBY depuis plusieurs années, convaincu par les raisons de M. MUTTKOWSKI.

strigosus Zett. Mindin, bois de pins, 10, 23 mai. — *Hemerobius marginatus* Steph. Blain, mai, Saint-Nazaire, juin. — *Boriomyia subnebulosa* Steph. Mindin, bois de pins, 10 mars.

Panorpides. — *Panorpa germanica* L. Blain, 22 avril, mai.

Limnophilides. — *Grammotaulus atomarius* F. Blain, 25 avril, mai. — *Glyptotaelius pellucidus* Retz. Blain, 1 mai. — *Limnophilus bipunctatus* L. Blain, 22, 25 avril. — *Limnophilus affinis* Curt. Blain, Mindin, avril. — *Micropterna sequax* Mac Lachl. Mindin, avril.

Séricostomides. — *Notidobia ciliaris* L. Blain, 24 avril. — *Goera pilosa* F. Forêt du Gavre, mai.

Polycentropides. — *Cyrnus trimaculatus* Curt. Saint-Nazaire, avril.

Saragosse, Collège du Sauveur, 30 octobre 1911.

Nouvelles formes de *Chrysopides* (Ins. Nèvr.) de France

par le R. P. LONGINOS NAVÁS (S. J.).

Parmi les 200 échantillons et plus de *Chrysopides* que j'ai reçus en communication de la part de l'infatigable Névroptériste de Niort (Deux-Sèvres) M. Joseph LACROIX, il y en avait un que je crois être une nouvelle espèce, se plaçant près du genre *Chrysocerca*, créé récemment par le regretté Névroptériste hollandais M. VAN DER WEELE (Notes from the Leyden Museum XXXI, 1909, p. 75). Ce genre est, d'après l'auteur, très voisin du genre *Chrysopa* et ayant les mêmes caractères plastiques, mais le mâle a une paire de *cerci* (cerques, app. sup.) courbés, formant un long forceps.

Le caractère principal qui s'applique parfaitement à d'autres espèces, par exemple *flava* Scop., *guadarramensis* Ed. Pict., etc., ne convient pas exactement à l'individu en question.

Si l'on admet le genre *Chrysocerca* tel qu'il est formé, il serait peut-être plus convenable d'en créer un autre dont cette nouvelle espèce serait le type. J'inclurais aussi mon espèce *Chrysocerca Kusnerovi* de Crimée, à *cerci* droits, dans ce nouveau genre. Voilà ses caractéristiques.

Chrysotropia ⁽¹⁾ nov. gen.

Antennae alis haud longiores, articulo primo grandi, longo.
Prothorax transversus.

(1) Du grec *τρόπις*, carène, allusion au bout de l'abdomen du ♂ caréné.